

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВАКЦИНИРОВАНИИ ПРОТИВ ГРИППА



Прививки против гриппа должны по возможности получать все группы населения, начиная с 6-месячного возраста, однако первоочередным показанием к вакцинации является принадлежность к **группам риска:**

и хроническим бронхитом;

- лица с болезнями сердца;
- лица, получающие иммunoсупрессивную терапию;
- лица с серповидно-клеточной анемией и другими гемоглобинопатиями;
- пациенты с сахарным диабетом, хроническими почечными и метаболическими заболеваниями;
- лица с иммунопатологией, включая ВИЧ-инфекцию;
- дети и подростки, длительно получающие аспирин (риск возникновения синдрома Рея);
- лица старше 65 лет;
- медицинские работники;
- все домашнее окружение лиц из групп риска;
- беременные женщины (2 и 3 триместры беременности);
- любые граждане, кто хотел бы защитить себя от инфицирования, например, у кого особые обязательства, в силу которых человек не может позволить себе долго болеть;
- учащиеся, студенты или те, кто проводит много времени в закрытых коллективах.

Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.

Более того, вакцинация матери и других членов семей, в которых есть грудные дети, рекомендуется по следующим причинам:

- у кормящей матери в ответ на прививку вырабатываются антитела, которые проникают в молоко и передаются ребенку, создавая ему дополнительную защиту;
- если все члены семьи, которые близко контактируют с ребенком, будут привиты, они сами не заболеют гриппом, и соответственно, не заразят ребенка.

По материалам ГУ «ГОЦГЭ и ОЗ»

Ответственный за выпуск

Л.С.Белко