

Профилактика трихинеллёза

Трихинеллёз – паразитарная болезнь человека и животных, вызываемая паразитированием кишечных гельминтов – трихинелл, личинки которых локализуются в поперечнополосатых мышцах, вызывают лихорадку и аллергические проявления.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов (сырого фарша, сыровяленых домашней колбасы и окорока, шашлыков, жареного мяса и других), контаминированных личинками трихинелл. Путь передачи пищевой.

Заражение диких животных происходит в результате хищничества, а также поедания трупов павших животных. Домашние животные заражаются при поедании продуктов убоя, пищевых отходов, трупов павших животных.

Трихинеллез протекает тяжело и часто с тяжелыми осложнениями. Повышается температура до 38-40 градусов, появляется слабость, боли в горле, покраснение глаз, боли в животе, поташнивание, отеки на лице, главным образом отеки век. Чтобы избежать отравления рекомендуется употреблять в пищу только то мясо и мясопродукты, которые прошли экспертизу. Личинки трихинелл погибают при варке в течение 2.5 часов, толщина куска должна быть не более 8 см.

Для профилактики заболеваний трихинеллёзом следует помнить, что:

- личинки трихинелл устойчивы к варке, копчению, жарению, обработке в микроволновой печи и замораживанию. Личинки трихинелл погибают при варке в течение 2.5 часов, толщина куска должна быть не более 8 см;
- в процессе приготовления пищи не рекомендуется пробовать сырой мясной фарш;
- не допускается выбрасывание отходов убоя в выгребную яму или мусорный ящик;
- не следует приобретать мясные изделия у неизвестных лиц вне государственных точек торговли, а также мясопродукты, не имеющие клейма или свидетельства о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы;
- запрещается употреблять в пищу и распространять мясо (мясопродукты) домашних свиней, а также кабанов и других плотоядных и всеядных животных без предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы; в случае невыполнения данного требования при расследовании

вспышек трихинеллеза виновные несут ответственность за нарушения санитарного законодательства Республики Беларусь.

Трихинеллоскопическое исследование следует проводить непосредственно после убоя животных в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы учреждения «Житковичская районная ветеринарная станция» по адресу: г.Житковичи, ул.Карла Маркса,1,на территории центрального рынка РайПО, тел. 27-8-93.

Предъявления в лаборатории каких-либо документов о правах собственности на тушу или охотничьих лицензий на отстрел животных для этого не требуется (пункт 20 «Ветеринарно-санитарных правил по борьбе с трихинеллезом животных в Республике Беларусь», утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 9 апреля 2007г. №29).

По материалам Житковичского районного ЦГЭ